Eine Reise durch den Magen-Darm-Trakt: Gastrointestinale Probleme bei Kindern und Jugendlichen

Dr.med. George Marx
Gastroenterologie und Ernährung
August 2018

Wohl noch nichts vom Kurzstudium gehört, was ??

Agenda

- Bauchweh
- Obstipation
- Blut im Stuhl/Erbrochenen
- Fremdkörper
- Wenn der Zucker krank macht (Laktose, Fruktose)

Perzentilenkurve: Länge und Gewicht

- Toni ■
 - Länge 158 cm
 - Gewicht 59 kg
- Hans ●
 - Länge 136 cm
 - Gewicht 28 kg
- Perzentilen geben Auskunft über der zeitlichen Verlauf von Gewicht und Grösse im Vergleich zur Normal-Population
- Bsp.:90.Perzentile heisst, dass 90% der Gleichaltrigen kleiner oder leichter sind

Bauchweh im Kindesalter

Bauchweh

Was für Bauchwehtypen gibt es?

- Akut vs Chronisch
- Organisch vs Funktionell vs. Psychosomatisch

Akute Bauchschmerzen

- Heftige, akut einsetzend
- Allgemeinsymptome häufig

- Wichtige Fragen:
- Wo? Wie lang? Kolikartig? Grunderkrankung?
- Erbrechen?
- Durchfall?
- Beides oder nur eines von beidem
- Blut im Stuhl?
- Symptome in Familie

Akute Bauchschmerzen

- 5% aller ungeplanten Konsultationen
- Nur 1% werden chirurgisch versorgt
- Berücksichtigung des Alters

- Lage der Bauchschmerzen

Akute Bauchschmerzen

- Akute Magen-Darm-Grippe
- Obstipation
- Appendizitis
- Trauma
- HWI
- Mens Beschwerden
- Diabetes mellitus
- Invagination/Volvulus

RAP= Recurrent Abdominal Pain

Definition von Apley 1950 (Apley J et al:Arch Dis Child 1958)

- Chronisch rezidivierende Bauchschmerzen, mindestens 1 Episode pro Monat in 3 aufeinanderfolgenden Monaten.
- Einfluss auf die täglichen Verrichtungen.

20% Schulkinder (Hyams JS et al:J Pediatr 1996)

Chronische Bauchschmerzen

Organisch vs. Funktionell

- Alter <5
- Allgemeine Symptome (Fieber, Gewichtsverlust, Gelenkschmerzen)
- Erbrechen (Blut, gallig)
- Aus dem Schlaf
- Lokalisation
- Flankenschmerz
- Ausstrahlung
- Anale Erkrankung
- Occultes Blut
- Labor

Chronische Bauchschmerzen

Funktionelle Bauchschmerzen

- Periumbilikal
- Selbstlimitierend
- Unabhängig von Mahlzeiten, Aktivitäten
- Kein Aufwachen nachts
- Normales Gedeihen
- Unauffälliger Status
- Beeinträchtigung nicht proportional zu Beschwerden
- Nicht durch anatomische oder biochemische Anomalien erklärbar

Chronische Bauchschmerzen

Labor

Blutbild

Resorptionsparameter

Chemie: Leberwerte /Nierenwerte, Pankreaswerte

CRP / BSR

Gliadin AK

Urinstatus

Stuhlproben (Parasiten, Bakt, Elastase)

Calprotectin

C13 Atemtest???

Schweisstest

RX Abdomen (evtl. US)

H2 AtemTest

Differentialdiagnose

- Chronisch Entzündliche Darmerkrankungen (zB M.Crohn)
- **Chronische Obstipation**
- Gastroösophagealer Reflux
- Funktionelle Dyspepsie und IBS (Rome III Kriterien)
- KMPI und **Laktoseintoleranz**
- **Coeliakie**

- Peptische Erkrankungen (HP)
- Pankreatitis
- Parasiten
- HWI
- Kongenitale Anomalien

Red flags

- Reduz. AZ, Blässe
- Gewichtsverlust, Wachstumsverlangsamung
- Rez. Fieber
- Blutiges oder galliges Erbrechen
- Blut im Stuhl
- Anhaltende oder rez. Durchfälle
- Nabel-ferne Bauchschmerzen
- Schmerzbedingtes nächtliches Aufwachen
- Abdominelle Resistenzen

Chronisch entzündliche Darmerkrankungen

M.Crohn

Colitis Ulcerosa

Coeliakie, London 1930

Fig. 2.—Photograph of five cases of coeliac disease showing the general clinical features

Coeliakie

Gliadin AK

- Anti Gliadin IgG
- Anti Gliadin IgA
- Anti- Transglutaminase
- Gesamt IgA

Neue Richtlinien

THERAPIE

Nach Diagnosesicherung lebenslange glutenfreie Ernährung

- glutenfrei heisst: kein **Weizen, Roggen, Gerste**, sowie verwandte Sorten wie Dinkel, Grünkern , Kammut, Emmer, Triticale, Einkorn
- „kann Spuren von Gluten enthalten“
- Hafer ?
- Erlaubt sind: Reis, Mais, Quinoa, Hirse, Buchweizen, Hülsenfrüchte, Kastanien, Maniok, Amarant, (Urdinkel)

THERAPIE

Zöliakiebetreffende sind nicht krank, wenn sie eine glutenfreie Ernährung einnehmen. Theoretisch richtig, doch praktisch schwierig umzusetzen!

- limitierte Nahrungsmittelauswahl
- geringerer Nährwert (weniger Kohlenhydrate, mehr Fette)
- besonderer Geschmack glutenfreier Präparate
- höhere Kosten für Nahrungsmittel
- schwierige Ausserhausverpflegung (Angebot, soziale Aspekte)

LANGZEITFOLGEN...

... der unbehandelten Erkrankung:

- Wachstumsretardierung
- Zahnschmelzdefekte
- Osteoporose
- Fertilitätsprobleme
- Chronische Lebererkrankungen
- Psychische Störungen (Depression)
- Assoziation zu malignen Tumoren (T-Zell-Lymphome des Darmes)

EMPFOHLENE LITERATUR

Zöliakie und Ernährung in der Schweiz – eine Standortbestimmung

**Stellungnahme und Empfehlungen der
Eidgenössischen Ernährungscommission (EEK) 2010**

[www.bag.admin.ch/themen/ernaehrung_bewegung/05207/10411/index.html?lang=de.](http://www.bag.admin.ch/themen/ernaehrung_bewegung/05207/10411/index.html?lang=de)

Vorgeschlagene Klassifikation von “Gluten Erkrankungen”

H. Pylori

**C13 Atemtest
Stuhl AG Test**

Helicobacter Pylori

Ulkus Antrum

MALT Lymphom

THERAPIE

PPI und 2 verschiedene A

-Amoxicillin, Clarithromycin, PPI

-Amoxicillin, Metronidazol, PPI

**80-90%
Eradikation**

10-14 Tage

PRÄVENTION

HP Impfung

Askariden, Spulwurm

Oxyuren

Oxyuren

Therapeutische Ueberlegungen

Nematoden	1. Wahl	Alternativen	
Askaris, Ankylostoma / Nekator, Trichostrongylus	Mebendazol 2 × 100 mg/d für 3 Tage (gleiche Dosis für Kinder >1 J.) oder Pyrantel 10 mg/kg 1 ×	Albendazol 400 mg 1 × Kinder: 1–2 J. oder <10 kg ½ Dosis	Für Ankylostoma / Nekator: falls Pyrantel: 10 mg/kg 1 ×/d für 3 Tage
Enterobius (Oxyuris)	Mebendazol 100 mg 1 × Pyrantel (Dosis s.o.)	Albendazol (Dosis s.o.)	Gleiche Therapie nach 2 Wochen wiederholen (siehe Text)

Chronische Obstipation

Verstopfung = Chronische Obstipation

- Bauchschmerzen, z.T. kolikartig
- Stuhlverhalt
- Stuhlschmierer, Enkopresis
- Inappetenz
- Blutauflagerungen
- Verhaltensauffälligkeiten

Verstopfung

- Physiologische Stuhlfrequenz/Woche
 - 0 - 3 Monate (gestillt) 5 - 40
 - 0 – 3 Monate (Formula) 5 - 28
 - 6 – 12 Monate 5 - 28
 - 1 – 3 Jahre 4 - 21
 - > 3 Jahre 3 - 14

Definition Obstipation

- Verzögerte oder erschwerte Defäkation über mehr als 2 Wochen
- Habituelle Obstipation: Ausschluss organischer Ursachen
- Chronische Obstipation: Dauer > 8 Wochen
- Was ist normal (physiologische Stuhlfrequenzen)?
 - Erste Lebenswoche: 4 Stühle pro Tag
 - Bis zum 2. Lebensjahr: 1.7 Stühle pro Tag
 - Ab 4 Jahren: 1.2 Stühle pro Tag

 - Gestillte Säuglinge: 12x/d bis einmal alle 14d

Pathogenese der habituellen Obstipation

Verstopfung

Verstopfung?

'Bristol stool form scale'

Charakterisierung des Stuhlgangs	Umschreibung	Dosierung
<p>1</p>	<p>einzelne harte Kotbällchen (schwieriger Stuhlgang)</p>	<p>Movicol®-Dosierung erhöhen</p>
<p>2</p>	<p>klumpiger Stuhl</p>	<p>Movicol®-Dosierung erhöhen</p>
<p>3</p>	<p>wurstförmiger Stuhl von bröckeliger Struktur</p>	<p>Movicol®-Dosierung beibehalten</p>
<p>4</p>	<p>wurstförmiger Stuhl von weicher und glatter Struktur</p>	<p>Movicol®-Dosierung beibehalten</p>
<p>5</p>	<p>weicher Stuhl mit klaren, scharfen Konturen (einfacher Stuhlgang)</p>	<p>Movicol®-Dosierung verringern</p>
<p>6</p>	<p>weicher bis sehr weicher Stuhl mit unklaren Konturen</p>	<p>Movicol®-Dosierung verringern</p>
<p>7</p>	<p>wässriger Stuhlgang ohne Struktur (flüssig)</p>	<p>Movicol®-Dosierung beenden</p>

Therapieprinzipien

- Instruktion, Motivation und Begleitung der Kinder und Eltern
- leeren und leer halten
- Möglichst keine Manipulation anal/rektal: keine Defäkationshilfe mit Fieberthermometer, keine Einläufe (Ausnahme im Notfall bei akuten Abdominalkoliken in Absprache mit Kind/Eltern)

Übersicht Therapie

- Medikamente
- Toiletten-Training
- Ess-/Trinkverhalten
- Kuhmilchdiät?
- Weitere: Psychotherapie, Verhaltenstherapie

Behandlungsmethode nach Zabłudowski um 1900

Medikamente

Kolonentleerung:

- Säuglinge: Beginn mit Duphalac, ggf. Macrogol (Zulassung ab 2 Jahren, aktuelle Studien an Kindern >6 Monate mit guter Effizienz und Sicherheit)
- Kleinkinder >1 Jahr: Beginn mit Macrogol
- ab 6 Jahren: X Prep 1ml/kg/D mit viel Flüssigkeit
- Im Notfall, wenn das Kind starke Koliken hat: hoher Einlauf oder PC (cave Traumatisierung, mobilisiert häufig nur distales Kolon)

Medikamente

Erhaltungstherapie:

- Säuglinge: Duphalac, ggf. Macrogol
- Kinder >1 Jahr: Macrogol
- Jugendliche ev. Transipeg (forte)

Wie viel? nach Wirkung, Ziel: 1x/d weicher Stuhlgang und schmerzlose vollständige Defäkation, keine Rückhaltenmanöver, kein Stuhlschmierer

Wie lange? meist mehrere Monate (1/2 bis 1 bis 2 Jahre, manchmal länger). Erklärung: Dekonditionierung

Flohsamen

Lactulose
CHF 5.30-8.70
fruit

Macrogol (+ Salze)
CHF 17.75

Laxipeg
Zambon

Macrogol
CHF 18.45
Banane

Laktitol
CHF 6.70-10.05

apomedico.de

Lactulose
CHF 7.20

Macrogol (+ Salze)
CHF 17.75
aromafrei, Zitrone, Chocolat

Bisacodyl

Wieso Macrogol

geschmacksneutral

individuelle Dosierung

zuverlässige Wirkung

keine Nebenwirkungen

wenig Kosten

Toiletten-Training

- 2-3 Mal pro Tag für 10min aufs WC gehen
- immer zur gleichen Zeit
- am besten direkt nach dem Essen (gastrokolerischer Reflex)
- kein Stress, angenehme Atmosphäre, entspanntes Sitzen
- Loben, ev. Belohnungsstrategie
- Ziel: Dekonditionierung der Rückhaltemanöver

Ess- und Trinkverhalten

- Ausreichende Flüssigkeitszufuhr
- Sorbitolhaltige Nahrungsmittel: insbes. in Apfel-, Birnen- und Pflaumensaft enthalten
- Ballaststoffe? In der Literatur keine einheitlichen Angaben, Nutzen daher fragwürdig
- Insgesamt: ausgeglichene Kost mit viel Vollkornprodukten, Gemüse und Früchten empfohlen, aber als alleinige Therapie nicht entscheidend

Take home message

- Häufige Fehlinterpretation von Inkontinenz, Diarrhoe
- Banale habituelle Obstipation häufig mit erheblicher Morbidität
- Diagnose ergibt sich meist aus guter Anamnese und Status
- Einfache aber langwierige Therapie setzt Compliance der Eltern und Kinder voraus, daher
 - Initial gute Aufklärung und Motivation
 - Begleitung der Familien

Sr. Brunhilde,
Sie gehen jetzt unverzüglich zum Computer
und schauen bei Google nach,
was Sie dort zum Thema
"BLUTSTILLUNG"
finden !

Blut im Stuhl/Erbrochenen

Blut im Stuhl/Erbrochenen

Blut im Stuhl/Erbrochenen

Fremdkörper

Fremdkörper

Fremdkörper

Fremdkörper

- Münze im **oberen** Oesophagusdrittel:

➔ Endoskopische Entfernung

- Münze im **mittleren oder unteren** Oesophagusdrittel

➔ Wiederholung Röntgenthorax nach 12-24h
sofern Patient beschwerdefrei

➔ falls noch an Ort endoskopische
Entfernung

Vorgehen bei verschluckter Batterie

1. Was für eine Batterie ?

- Quecksilber-B: HG-oxid, Kaliumhydroxid
- Alkali-Mangan-B: Mangandioxid, Kaliumhydroxid
- Silberzell-B: Silberoxid, Kaliumhydroxid
- Lithium-Mangandioxid-Zell-B: Lithium, Mangandioxid

Vorgehen bei verschluckter Batterie

2. Abklären, ob Batterie neu oder gebraucht

Alte Batterien sind weniger toxisch

Vorgehen bei verschluckter Batterie

3. Thoraxröntgenbild

- Batterie im Oesophagus: endoskopisch entfernen
- Batterie im Magen und intakt: H2-Blocker
- Batterie kaputt, Zeichen für HG-Intoxikation: Entfernung

Fremdkörper Magnete

Arrodierte Knopfbatterie

Kohlenhydrate

- Einfachzucker = Monosaccharide
Glukose, **Fruktose**, Galaktose, Mannose
- Doppelzucker = Disaccharide
Saccharose, **Laktose**, Maltose, Laktulose
- Mehrfachzucker = Polysaccharide
Stärke, Zellulose, Glykogen, Chitin

Die Laktoseintoleranz

Laktoseintoleranz Definition

- Milchzuckerunverträglichkeit bei vollständigem oder partiellem Fehlen von Laktase
- Enterocyten (in den Darmzotten)

Weltweite Verteilung der Laktoseintoleranz

Formen

- Hereditärer Laktasemangel

Erwachsenentyp

Partieller Laktasemangel

20 Mio in Deutschland

Formen

- **Sekundärer Laktasemangel**

- Nach Gastroenteritis

- Bei Coeliakie

- Bei M Crohn

- Andere Intestinale Erkrankungen

Symptome

- Bauchschmerzen
- Koliken
- Völlegefühl
- Blähungen
- Durchfall
- Uebelkeit

Diagnostik

- Gold Standard: **H₂ Test**
- BZ Messung nach Laktosebelastung
 - Fehlender Anstieg von Glukose im Blut (< 20mg/dl)
- Genotypisierung
- Dünndarmzottenbiopsie

Diagnostik

Enzymaktivitätsbestimmung in
Dünndarmzottenbiopsie

Diagnostik

H₂ Atemtest

- 50g Laktose bei Erwachsenen
- Bei Kindern: 10g pro 10 kg KG
- Nachweis von H₂ in der Atemluft (> 20ppm)

Anaerobe Vergärung

Dickdarmbakterien

Anaerobe Vergärung

Wasserstoff
H₂

Kohlendioxid
CO₂

Methan
CH₄

Kurzkettige Fettsäuren

Die Laktoseintoleranz

Die Laktoseintoleranz

Die bakterielle Dünndarmbesiedlung

Therapie

- Laktosearme Ernährung
- Enzymsubstitution
- In CH: **Lactdigest**

Laktosearme Ernährung

Laktosehaltig

Milch

Voll-Drink.Magemilch
Kuh-Schaf-Ziegenmilch
Molke, Kondensmilch

Milchprodukte

Joghurt, Kefir, Quark, Weichkäse

Fleisch

Hackbraten, Lyoner, Fleischkäse,
Streichwurst, Blutwurst, Wienerli,
Hamburger

Laktosefrei

Milch

Laktosefreie Milch
Mandel,- Reis,-Hafer,-Dinkeldrinks

Milchprodukte

Sojajoghurt, Laktosefreie Joghurt
Hartkäse

Fleisch

Frisches Fleisch, Bündnerfleisch,
Schinken, Salami

Laktosearme Ernährung

www.coop.ch

The logo for 'freefrom' is displayed in a blue, lowercase, sans-serif font. It is positioned on the left side of a green banner. The text is accompanied by a blue arc underneath it, and a sunburst effect emanates from the top left of the 'f'.

Coop Free From - für Genuss ohne Beschwerden!

Ist für Sie eine Lebensmittel-Allergie oder -Unverträglichkeit ein Thema? Jetzt handeln!

www.migros.ch

Calcium

Pro 100g	Laktose	Calcium mg
Milch	5	120
Muttermilch, Molke	3-5	109
Kefir	3-5	120
Joghurt, Sauermilch	4-5	120
Quark	3-4	100
Rahm, Sauerrahm	3-5	Spuren
Weichkäse	1-3	500
Butter	Spuren	Spuren
Hartkäse	Keine Laktose	1200

Die Fruktosemalabsorption

Fruktosemalabsorption

- Defekt des Glucosetransporters GLUT5
- Eingeschränktes Resorptionsvermögen
- Angeboren oder erworben
- Problem mit Sorbit
- Glukose stimuliert Aktivität von GLUT 5
- Vorteile Saccharose

GLUT 5

Fruktosemalabsorption

CAVE

**Hereditäre Fruktoseintoleranz
(HI)**

Fruktoseintoleranz

- Fruktose-1-phosphat- Aldolase (Aldolase B)
- Glykolyse und Glukoneogenese blockiert
- Anreicherung von Fruktose-1-Phosphat in
 - Darm
 - Leber
 - Niere
- Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen
- Leber-und Nierenfunktionsstörungen

Fruktosemalabsorption

Symptome

- Reizdarmähnlich

Blähungen, Durchfall, RAP

Einflussfaktoren

- Art und Menge Darmbakterien
- Menge der Fruktose
- Zusätzliche Einnahme Glukose, Saccharose

Fruktosemalabsorption

Ernährung

- **Gemieden werden soll:**

Früchte, Fruchtsäfte

Gemüse, Gemüsesäfte

Süßgetränke, Limonaden

Zucker, Honig

Inulin

Zuckeraustauschstoffe (Isolamlt E953, Sorbit, Sorbitol, Mannit)