MILCHVIEHAUFZUCHT (3/4): Das erste Lebensjahr

Nach dem Abtränken Vollgas geben

Im ersten Lebensjahr wird der Rahmen bei den Rindern festgelegt. Lebens- und leistungsfähige Organe werden in dieser Zeit ausgebildet, erste Eierstockfunktionen setzen ein und die Euteranlage wird entwickelt.

MATHIAS MEIER*

Eine optimale Kälberfütterung ermöglicht bei gesunden Tieren stets die vollständige Ausreizung des Wachstumspotenzials. Dieses Ziel ist für die wirtschaftliche Leistung eines Betriebes ausserordentlich wichtig. Die Absatzphase stellt dabei eine der schwierigsten und für den Betriebsleiter herausforderndsten Phasen der Kälberaufzucht dar. Dem Kalb werden die natürlichsten Nährstoffe aus der Milch entzogen, und es muss sich vollumfänglich mit Festfutter ernähren. Dies verursacht häufig eine Stresssituation für das Kalb, während der es grundsätzlich krankheitsanfälliger wird. Um den Stress möglichst gering zu halten, darf man dem Kalb in dieser Phase keine zusätzlichen Veränderungen zumuten. Gefüttert werden noch die gleichen Komponenten wie in der Tränkephase. Ein Gruppen- oder Stallwechsel in der Absatzphase ist grundsätzlich zu vermeiden.

Hohe Tageszunahmen

400 kg Lebendgewicht im 14. Lebensmonat sind das Ziel. Um dies zu erreichen, müssen die Kälber in dieser Zeitspanne durchschnittlich rund 850 g Tageszunahmen vorweisen. Nur mit Heu können diese Zunahmen nicht erreicht werden. Deshalb lohnt sich ein Einsatz von

Rinder brauchen Licht, Luft, Ruhe und gutes Futter, dann werden sie ihr Wachstumspotenzial ausschöpfen. (Bild: Melior)

DIE TROCKEN-TMR

Eine Trocken-Totalmischration (TMR), auch als Kälbermüesli bekannt, kann beispielsweise mit einem Mischwagen, Schrägmischer oder mit anderen Misch- und Verteilwagen selber hergestellt werden. Bei kleineren Mengen kann auch ein Betonmischer verwendet werden. Das Müesli ist ohne Weiteres mehrere Wochen halt-

bar und kann entsprechend auf Vorrat gemischt werden. Eine hochwertige Aufzucht-TMR wird am besten aus einem Flocken/Würfel-Kombifutter und aus Heu oder Luzerne und Leinsaatprodukten zusammengesetzt. Dank der frühen Aufnahme einer Trocken-TMR mit einem idealen Kraftfutteranteil ad libitum können sich

die Pansenzotten beim Jungtier gut entwickeln. Je grösser die Pansenzotten und je mehr von ihnen vorhanden sind, desto grösser ist die Oberfläche, was wiederum eine maximale Nährstoffaufnahme ermöglicht. Der Einsatz des Kälbermüeslis kann bis zur Aufnahme von gut 2 kg täglich gesteigert werden. *mm*

Aufzuchtfutter in dieser Phase immer. Eine gute Pansenentwicklung ist äusserst wichtig, gleichzeitig soll das Kalb aber

weiterwachsen, während sich der Pansen entwickelt.

Um das Wachstum nach dem Absetzen zu maximieren, muss

dem Kalb genügend Energie gefüttert werden. Das kann zum einen durch die Gabe von Dürrfutter in Kombination mit Auf-

werden. Ist eine Waage auf dem Betrieb vorhanden, lohnt es sich, die Aufzuchtstiere alle drei Monate zu wägen. Ohne Waage kann man die Tiere effizient mit einem Massband messen. Messen ist immer noch besser als schätzen. Die Gewichte werden anschliessend in einem Auswertungsprogramm wie dem Swiss-JuniorControlling eingetragen und können grafisch dargestellt werden. Die Differenzen zu den Zielwerten werden so optisch sichtbar gemacht.

Luft, Licht, Temperatur

Damit die Kälber gesund und vital aufwachsen können, benötigen sie frische Luft und ausreichend helles Licht. Die gute Luftqualität und der geringe Keimdruck sind bei allen Haltungssystemen neben der Kolostralmilchversorgung wichtigste Voraussetzungen für eine gute Immunabwehr der Kälber. Aus Sicht des Tieres sind Temperaturen von 10 bis 20 Grad als ideal zu bezeichnen. Verfügen sie über einen gut eingestreuten, trocken und windgeschützten Liegebereich, kommen die relativ kältetoleranten Tiere selbst im Winter mit frostigen Temperaturen zurecht. Im Sommer hingegen können hohe Temperaturen verbunden mit einer intensiven Sonneneinstrahlung für die Kälber durchaus problematisch werden. Bei Temperaturen über 25 Grad wird die Wärmeabgabe der Kälber vermindert, sie beginnen zu schwitzen und zu hecheln. Gestresste Tiere fressen weniger und sind anfälliger für Krankheiten. Letztendlich kann die Entwicklung des Kalbes durch Hitzestress negativ beeinflusst werden.

zuchtfutter oder einer Trocken-TMR (siehe Kasten) erreicht werden. Von einer Silagen-TMR wird in dieser Zeit abgeraten, da die Pansenkapazität noch eingeschränkt ist.

Nach Gewicht besamen

Erstkalbealter von weniger als 24 Monaten sind heute bei den intensiven Milchviehassen keine Seltenheit mehr. Damit dies erreicht wird, werden die Rinder immer früher besamt. Entscheidend ist nicht das Alter bei der ersten Besamung, sondern das Gewicht. Rinder sollten mit einem Gewicht von 400 kg Lebendgewicht besamt

*Der Autor ist Verkaufsleiter und Milchviehspezialist bei Meliofeed AG.